

Tableau II. Invertébrés observés en 2009 et/ou 2010 et déterminés au moins jusqu'au genre (92 taxons). En gras, les espèces « nombreuses » (soit beaucoup d'individus à la fois, soit observées régulièrement tout au long de la saison). En maigre, les espèces représentées par quelques individus, voire un seul.

Coléoptères	Agone à tache dorsale	<i>(Anchomenus dorsalis)</i>
	Amara consulaire	<i>(Amara consularis)</i>
	Amara similaire	<i>(Amara similata)</i>
	Bombardier escopette	<i>(Brachinus sclopeta)</i>
	Harpale à distinguer	<i>(Harpalus distinguendus)</i>
	Harpale partagé	<i>(Harpalus dimidiatus)</i>
	Harpale voisin	<i>(Harpalus affinis)</i>
	Ophone à pattes rousses	<i>(Pseudoophonus rufipes)</i>
	Ophone à tarsi roux	<i>(Pseudoophonus calceatus)</i>
	Ophone gris	<i>(Pseudoophonus griseus)</i>
	Ophone limité	<i>(Ophonus diffinis)</i>
	Poécile cuivré	<i>(Poecilus cupreus)</i>
	Ptéristique mélanique	<i>(Pterostichus melanarius)</i>
	Hanneton estival	<i>(Rhizotrogus aestivus)</i>
	Cétoine à tarière	<i>(Valgus hemipterus)</i>
	Cétoine hirsute	<i>(Tropineura hirta)</i>
	Drap mortuaire	<i>(Oxythyrea funesta)</i>
	Silphe triste	<i>(Silpha tristis)</i>
	Taupin souris	<i>(Agrypnus murinus)</i>
	Coccinelle à 16 points	<i>(Tytthaspis sedecimpunctata)</i>
	Coccinelle à 7 points	<i>(Coccinella septempunctata)</i>
	Coccinelle à 22 points	<i>(Thea vigintiduopunctata)</i>
	Coccinelle à damier	<i>(Propylea quatuordecimpunctata)</i>
	Méloé	<i>(Meloe proscarabaeus)</i>
	Cantharide fauve	<i>(Rhagonycha fulva)</i>
	Moine	<i>(Cantharis rustica)</i>
	Oedémère noble	<i>(Oedemera nobilis)</i>
	Oedémère ochracée	<i>(Oedemera podagrariae)</i>
	Psilothrix bleu-vert	<i>(Psilothrix viridicaeruleus)</i>
	Lepture à 2 fascies	<i>(Stenurella bifasciata)</i>
	Léma à pieds noirs	<i>(Oulema melanopus)</i>
	Apion de l'oseille	<i>(Apion miniatum)</i>
	Lixe poudreux	<i>(Lixus algirus)</i>
Lixe des ombellifères	<i>(Lixus iridis)</i>	
Charançon couronné	<i>(Liparus coronatus)</i>	
Dermaptères	Perce-oreille commun	<i>(Forficula auricularia)</i>
Diptères	Tipule du chou	<i>(Tipula oleracea)</i>
	Tipule printanière	<i>(Tipula vernalis)</i>
	Sphaérophore notée	<i>(Sphaerophoria scripta)</i>
	Syrphe bâton	<i>(Epsyrphus balteatus)</i>
	Syrphe du groseillier	<i>(Syrphus ribesi)</i>
	Bombyle	<i>(Bombylius sp.)</i>
	Empis marqueté	<i>(Empis tessellata)</i>
	Mouche à damier	<i>(Sarcophaga carnaria)</i>
Echinomyie sauvage	<i>(Tachina fera)</i>	
Hétéroptères	Corée marginée	<i>(Coreus marginatus)</i>
	Punaise arlequin	<i>(Graphosoma italicum)</i>
	Punaise des bois	<i>(Pentatoma rufipes)</i>
	Punaise des baies	<i>(Dolycoris baccarum)</i>
	Punaise de la pomme de terre	<i>(Calocoris norwegicus)</i>
Punaise des prés	<i>(Exolygus pratensis)</i>	
Homoptères	Crachat de coucou	<i>(Philaenus leucopthalmus)</i>
Hyménoptères	Cèphe pygmée	<i>(Cephus pygmaeus)</i>

	Tenthredo de la ronce	(<i>Arge cyanocrocea</i>)
	Bourdon des pierres	(<i>Bombus lapidarius</i>)
	Bourdon terrestre	(<i>Bombus terrestris</i>)
	Abeille domestique	(<i>Apis mellifera</i>)
Lépidoptères	Piéride du chou	(<i>Pieris brassicae</i>)
	Piéride de la rave	(<i>Pieris rapae</i>)
	Souci	(<i>Colias crocea</i>)
	Belle-dame	(<i>Cynthia cardui</i>)
	Myrtil	(<i>Maniola jurtina</i>)
	Demi-deuil	(<i>Melanargia galathea</i>)
	Tircis	(<i>Pararge aegeria</i>)
	Point de Hongrie	(<i>Erynnis tages</i>)
	Hespérie de la houque	(<i>Thymelicus sylvestris</i>)
	Pyrale du maïs	(<i>Ostrinia nubilalis</i>)
	Crambus rayé	(<i>Chrysocrambus craterella</i>)
	Crambus des jardins	(<i>Chrysoteuchia culmella</i>)
	Ptérophore blanc	(<i>Pterophorus pentadactylus</i>)
	Ecaille martre	(<i>Arctia caja</i>)
	Noctuelle fiancée	(<i>Noctua pronuba</i>)
Mécoptères	Mouche scorpion	(<i>Panorpa communis</i>)
Odonates	Sympétrum	(<i>Sympetrum sp.</i>)
Orthoptères	Criquet des pâtures	(<i>Chorthippus parallelus</i>)
	Criquet duettiste	(<i>Chorthippus brunneus</i>)
	Criquet mélodieux	(<i>Chorthippus biguttulus</i>)
	Criquet tricolore	(<i>Paracinema tricolor bisignata</i>)
	Ephippigère carénée	(<i>Uromenus rugosicollis</i>)
	Grande sauterelle verte	(<i>Tettigonia viridissima</i>)
	Conocéphale gracieux	(<i>Ruspolia nitidula</i>)
	Grillon des champs	(<i>Gryllus campestris</i>)
Autres invertébrés	Argiope frelon	(<i>Argiope bruennichi</i>)
	Epeire diadème	(<i>Araneus diadematus</i>)
	Thomise variable	(<i>Misumena vatia</i>)
	Faucheux	(<i>Phalangium opilio</i>)
	Polydesme	(<i>Polydesmus sp.</i>)
	Armadille commun	(<i>Armadillidium vulgare</i>)
	Cloporte des mousses	(<i>Philoscia muscorum</i>)
	Cloporte des murs	(<i>Oniscus asellus</i>)
	Escargot petit gris	(<i>Helix aspersa</i>)
	Limace rouge	(<i>Arion ater</i>)